

磁石配方颗粒

Cishi Peifangkeli

【来源】 本品为氧化物类矿物尖晶石族磁铁矿磁石的炮制品按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取磁石饮片 12500g, 加水煎煮, 滤过(干浸膏出膏率为 0.1%~2.0%), 加入辅料适量, 混匀, 浓缩成清膏, 干燥(或干燥, 粉碎), 再加入辅料适量, 混匀, 制粒, 制成 1000g, 即得。

【性状】 本品为灰色至灰黑色的颗粒; 气微, 味淡。

【鉴别】 取本品 0.1g, 研细, 加盐酸 10ml, 振摇, 使溶解, 静置。

(1) 取上清液, 滴加亚铁氰化钾试液, 即生成深蓝色沉淀; 分离, 沉淀在稀盐酸中不溶, 离心, 其沉淀加入氢氧化钠试液, 搅匀, 即生成黄棕色沉淀。

(2) 取上清液, 滴加硫氰酸铵试液, 即显血红色。

【检查】 除溶化性外, 应符合颗粒剂项下有关的各项规定(《中国药典》2020 年版通则 0104)。

【含量测定】 取本品适量, 研细, 取约 0.5g, 精密称定, 置锥形瓶中, 加盐酸 15ml 与 25%氯化钾溶液 3ml, 盖上表面皿, 加热至微沸, 不断振摇, 待分解完全, 瓶底仅留白色残渣时, 取下, 用少量水洗涤表面皿及瓶内壁, 趁热滴加 6%氯化亚锡溶液(取氯化亚锡 6g, 加盐酸 20ml, 加热使溶解, 放冷, 加水定容至 100ml, 摇匀, 即得)至显浅黄色(如氯化亚锡加过量, 可滴加高锰酸钾试液至显浅黄色), 加水 100ml 与 25%钨酸钠溶液 15 滴, 并滴加 1%三氯化钛溶液(1%三氯化钛溶液 取三氯化钛溶液适量, 加盐酸 2ml, 加水定容

江西省中药配方颗粒标准

至 100ml，即得，本液含三氯化钛应为 1%）至显蓝色，再小心滴加重铬酸钾滴定液（0.01667mol/L）至蓝色刚好褪尽，立即加硫酸-磷酸-水（2：3：5）10ml 与二苯胺磺酸钠指示液 20 滴，用重铬酸钾滴定液（0.01667mol/L）滴定至溶液显稳定的蓝紫色。每 1ml 重铬酸钾滴定液（0.01667mol/L）相当于 5.585mg 的铁（Fe）。

本品每克含铁（Fe）应为 5.0mg~100.0mg。

【规格】 每 1g 配方颗粒相当于饮片 12.5g

【贮藏】 密封。

起草单位：江西一方天江药业有限公司

复核单位：天津市药品检验研究院

参与单位：/